

Pflegeanleitung für Orchideen

Oncidium, Cambria Epidendrum, Miltonia



Standort:

Hell und sonnig. Auch ein leicht beschatteter Platz im Garten ist im Sommer möglich.

Temperatur:

Im Sommer am Tage gern 25°C, nachts auf 15 – 20°C absinkend. Im Winter reichen am Tage etwa 18°C, nachts 15°C.

Gießen:

Im Sommer, wenn der neue Trieb wächst, wird das Substrat immer feucht gehalten, darf aber nicht stauend nass sein. Deshalb kräftig gießen und Wasser wieder ablaufen lassen. Im Winter und nach der Blüte tritt eine Ruhepause ein. Es wird nur so viel gegossen, dass die Bulben nicht zu stark schrumpfen.

Düngen:

Während der Wachstumsphase von März bis Oktober alle 14 Tage mit Orchideendünger in der Hälfte der angegebenen Konzentration düngen. In der lichtarmen Zeit (November – Februar) nicht düngen.

Verblühte Rispen:

Abschneiden, wo die Rispe aus der Pflanze wächst. Bulbe (Verdickung) und Blätter NICHT entfernen. Dies ist ein Energiespeicher für die Pflanze. Um wieder zu blühen, muss die Pflanze einen komplett neuen Trieb bilden.

Vanda Hybriden

Standort:

Hell, keine volle Mittags-Sommer-Sonne.

Temperatur:

Zimmertemperatur mit Nachtabsenkung. Bei Freilandaufenthalt sollten 10°C nicht für längere Zeit unterschritten werden.

Gießen:

Bei hängenden Pflanzen im Sommerhalbjahr täglich die Wurzeln besprühen oder tauchen. Werden die Pflanzen zur einfacheren Pflege im Zimmer in einer Glasvase gehalten, diese 2 – 3-mal wöchentlich mit Wasser füllen und nach ca. 20 – 30 Minuten wieder abgießen.


Düngen:

Im Sommerhalbjahr von März bis Oktober 1 – 2-mal mit angegebener Konzentration eines Orchideendüngers behandeln. Die übrige Zeit höchstens 1-mal im Monat düngen mit der Hälfte der angegebenen Konzentration.

Verblühte Rispen:

Abschneiden, wo die Rispe aus der Pflanze wächst. Pflanze treibt aus anderen Blattachsen wieder aus.

Paphiopedilum (Frauenschuß)



Standort:

Fensterbank im Sommer halbschattig.

Nur im Winter mit vollem Licht.

Grünlaubige Sorten können von

Anfang Juni bis September im Freien

an einem schattigen Platz stehen,

wo sie auch Regen und Tau

ausgesetzt sind. Sie blühen dann

besser.

Temperatur:

Normale Zimmertemperatur.

Nachts auf ca 15°C absinkend.

Gießen:

Im Sommer das Substrat immer feucht halten.

Im Winter vorsichtiger gießen, aber nie ganz trocken werden lassen. Kein zu hartes Wasser verwenden.

Düngen:

Während der Wachstumsphase von März bis Oktober alle 14 Tage mit Orchideendünger in der Hälfte der angegebenen Konzentration düngen. In der lichtarmen Zeit (November – Februar) nicht düngen.

Verblühte Rispen:

Abschneiden, wo die Rispe aus der Pflanze wächst. Die alten Blätter nicht entfernen. Um wieder zu blühen, muss die Pflanze einen komplett neuen Trieb bilden.

Cattleya



Standort:

Hell und warm. Erst, wenn im Sonnenlicht die Blätter mehr als handwarm werden, etwas beschatten. Im Sommer auch im Freien an einem geschützten Platz. Ideal auch für den Wintergarten.

Temperatur:

15°C sollten für länger Zeit nicht unter- und 30°C nicht überschritten werden. Bei wenig Licht auch weniger Wärme. Im Winter nicht über 18°C.

Gießen:

Im Sommer das Substrat abtrocknen lassen, dann kräftig gießen, bis das Wasser aus dem Topf herausläuft. Handwarmes Wasser mit wenig Härte verwenden. Nicht im Wasser stehen lassen! Im Winter trockener halten.

Düngen:

Während der Wachstumsphase von März bis Oktober alle 14 Tage mit Orchideendünger in der angegebenen Konzentration düngen. In der lichtarmen Zeit (November – Februar) nicht düngen.

Verblühte Rispen:

Abschneiden, wo die Rispe aus der Pflanze wächst. Bulbe (Verdickung) und Blätter NICHT entfernen. Dies ist ein Energiespeicher für die Pflanze. Um wieder zu blühen, muss die Pflanze einen komplett neuen Trieb bilden.

Schönaicher

Pflanzengärtnerei

Steinenbrunner Str. 40

71101 Schönaich

Tel: 07031/654302

geöffnet von

Mo-Fr: 9-12 Uhr und 13-18 Uhr

Sa: 9-13 Uhr

Dendrobium Kingianum-Gruppe



Standort:

Hell und viel Licht im Hochsommer. Über Mittag direktes Sonnenlicht vermeiden.

Ein Aufenthalt im Freien während des Sommers tut der Pflanze gut.

Temperatur:

Im Sommer tagsüber bis 25°C, nachts absinkend auf 12 – 15°C.

Im Winter tagsüber nicht über 15°C, nachts bis zu 8 – 10°C.

Gießen:

Während des Wachstums mäßig gießen, zwischendurch austrocknen lassen.

Während der Ruhepause von November bis Januar trockener halten. Die Bulben nicht schrumpfen lassen.

Düngen:

Wie bei anderen Dendrobium-Arten. Mit Erscheinen des neuen Triebes von Februar/März bis Oktober alle 14 Tage mit Orchideendünger in der angegebenen Konzentration düngen. In der lichtarmen Zeit (November – Februar) nicht düngen.

Verblühte Rispen:

In der Regel nichts abschneiden! Wenn sie neue Blätter bildet, fühlt sie sich wohl und blüht nächstes Jahr wieder.

Nur abschneiden, wenn ein Trieb abgestorben ist.

Dendrobium Nobile-Gruppe

Standort:

Immer möglichst hell. Nur wenn die Blätter durch das Sonnenlicht warm werden, etwas beschatten.

Temperatur:

Im Sommer am Tage bis 30°C, nachts abfallend bis 15°C. Im Winter nicht über 20°C, nachts nicht unter 10 – 12°C.

Gießen:

Während ein neuer Trieb wächst, kräftig gießen und das Substrat wieder gut abtrocknen lassen.

Nach Abschluss des Wachstums das Gießen langsam einschränken und im Winter nur so viel gießen, dass die Pflanzen nicht schrumpfen.


Düngen:

Während der Wachstumsphase von März bis Oktober alle 14 Tage mit Orchideendünger in der Hälfte der angegebenen Konzentration düngen. In der lichtarmen Zeit (November – Februar) nicht düngen.

Verblühte Rispen:

In der Regel nichts abschneiden! Wenn sie neue Blätter bildet, fühlt sie sich wohl und blüht nächstes Jahr wieder.

Nur abschneiden, wenn ein Trieb abgestorben ist.



Zygopetalum Cymbidium

Standort:

Hell und nur bei starker Sonne leicht beschatten.

Im Winter volles Licht. Kann im Sommer mit etwas Schutz vor Wind und Sonne von Juni bis September auch im Freien stehen.

Temperatur:

Im Sommer normale Zimmertemperatur, im Winter etwa 5°C weniger.

Gießen:

Im Sommer das Substrat immer feucht halten. Im Winter etwas vorsichtiger wässern, aber nie ganz trocken werden lassen.

Düngen:

Während der Wachstumsphase von März bis Oktober alle 14 Tage mit Orchideendünger in der angegebenen Konzentration düngen. In der lichtarmen Zeit (November – Februar) nicht düngen.

Verblühte Rispen:

Abschneiden, wo die Rispe aus der Pflanze wächst. Die alten Blätter nicht entfernen. Um wieder zu blühen, muss die Pflanze einen komplett neuen Trieb bilden.



Phalaenopsis

Standort:

Hell bis mäßig schattig. Die Blätter dürfen von der Sonne nicht mehr als erwärmt werden. Im Winter volles Licht. Für das Fensterbrett bestens geeignet. Keine direkte Sonne.

Temperatur:

Im Sommer und im Winter am Tage 20 – 25°C, nachts mindestens 18°C. Zur Förderung des Blütenansatzes die Pflanze für ca. 6 Wochen in einen kühleren Raum stellen.

Gießen:

Im Sommer das Substrat abtrocknen lassen, dann kräftig wässern. Abtropfen lassen, kein Fußbad im Übertopf.

Im Winter vorsichtiger gießen. Nur zimmertemperiertes Wasser verwenden.

Düngen:

Während der Wachstumsphase von März bis Oktober alle 14 Tage mit Orchideendünger in der angegebenen Konzentration düngen. In der lichtarmen Zeit (November – Februar) nicht düngen.

Verblühte Rispen:

Sofort nach der letzten Blüte und bevor der Trieb eintrocknet ca. 1 cm über dem 3. Auge (Ringe am Blüentrieb) abschneiden. So kann der Trieb hier nochmal austreiben. Nach 2. Blüte abschneiden, wo die Rispe aus der Pflanze wächst. Pflanze bildet einen neuen Trieb.

